

# PL:

## KERALIT® Huf-Festiger

### Chroni - Pielęgnuje - Stabilizuje

Redukuje łamliwość i ścieranie się rogu kopytowego. Idealny dla koni niepodkutych. Ochrona przed chorobą linii białej. Dobrze dopasowuje się do podkowy. Wzmacnia ściany i podeszwy.

#### **Stabilizuje kopyta poprzez wiązania molekularne**

- KERALIT HOOF STABILIZER to połączenie substancji aktywnych, które poprawiają i wzmacniają białka obecne w rogu kopytowym. KERALIT HOOF STABILIZER stymuluje cząsteczki keratyny, czyli głównego składnika i białka rogu kopytowego, do tworzenia coraz to nowych wiązań z sąsiednimi cząsteczkami. To znacznie poprawia wytrzymałość i odporność na ścieranie rogu kopytowego bez negatywnego wpływu na mechanizm kopyta i jego nawilżenie.
- W przeciwieństwie do innych produktów, KERALIT HOOF STABILIZER nie tworzy wewnętrznej warstwy ochronnej ani nie dodaje obcej substancji do rogu: raczej pomaga poprzez wzmocnienie struktury molekularnej rogu.
- W porównaniu z twardymi kopytami koni żyjących na wolności, kopyta koni udomowionych są bardzo obciążone przez życie w stajni, jazdę po twardym podłożu i stres związany z zawodami. Róg kopytowy jest dodatkowo uszkodzany przez produkty degradacji i mikroorganizmy znajdujące się w ściółce stajennej. Powoduje to często pęknięcia, rysy i szczeliny, a także sprawia, że róg kopytowy staje się miękki i podatny na procesy gnilne. Kopyta podkuwane często pękają lub zdzierają się w okolicy gwoździ lub starych otworów po gwoździach, nie zapewniając już idealnego dopasowania podkowy.

Takim uszkodzeniom można zapobiec stosując KERALIT HOOF STABILIZER, który poprawia jakość rogu. Zdrowy, rosnący róg kopytowy zostanie skutecznie ustabilizowany i zabezpieczony przed przedwczesnym starzeniem się. Zastosowanie KERALIT HOOF STABILIZER zmniejsza również negatywny wpływ amoniaku i mikroorganizmów występujących w ściółce stajennej.

### **Same dodatki paszowe nie wystarczą!**

Pasza często zawiera witaminy i mikroelementy poprawiające jakość rogu. Są one jednak skuteczne tylko w przypadku rogu w okolicy koronki. Róg ściany kopyta pod koronką składa się z „martwych” komórek, które nie mogą być już odżywiane przez substancje odżywcze znajdujące się w krwiobiegu. Zdrowy róg wytworzony w koronce potrzebuje prawie roku, aby dotrzeć do ściany podporowej kopyta. **KERALIT HOOF STABILIZER działa natychmiastowo na ścianę podporową i podeszwę, wzmacniając i utwardzając róg w tych miejscach. Już po dwóch tygodniach stosowania preparatu KERALIT HOOF STABILIZER można zauważyć nieco bardziej błyszczący róg i znacznie wyraźniejszy odgłos kopyt na podłożu.**

### ***KERALIT Instrukcje dot. stosowania:***

- *Podczas stosowania produktu koń powinien stać na czystej, suchej powierzchni w dobrze wentylowanym miejscu.*
- *Dla uzyskania optymalnego efektu **KERALIT HOOF STABILIZER** musi wnikać w róg. Najlepiej jest to osiągnąć, gdy kopyta przed zabiegiem są czyste, suche i odtłuszczone. Przez 2-3 dni przed zabiegiem nie należy nakładać na te miejsca substancji zawierających tłuszcz lub olej. Nie należy myć kopyt przed zabiegiem.*
- *Najlepsze rezultaty osiąga się, jeśli koń wcześniej przejdzie po piasku lub używając twardej szczotki.*
- ***KERALIT HOOF STABILIZER** należy stosować dwa razy w tygodniu przez pierwsze 2-3 tygodnie, a następnie raz w tygodniu. Podczas każdego zabiegu nanieść stabilizator 2-3 razy na powierzchnię kopyta za pomocą pędzelka. Następnie pozostawić konia w spokoju na około 15 minut, pozwalając **KERALIT HOOF STABILIZER** wnikać lub wyschnąć. W tym czasie kopyta poddane zabiegowi nie muszą być trzymane w powietrzu.*

■ Nakładać tylko na podszwy (nie strzałki), ściany wsporowe i dolne części ścian kopyta (patrz ilustracja na odwrocie). Nie stosować **KERALIT HOOF STABILIZER** na koronkę lub piętę!

■ Nie należy stosować preparatu **KERALIT HOOF STABILIZER** na zranione kopyta, o ile nie zaleci tego lekarz weterynarii.

#### **Do stosowania przy zimnej, mokrej pogodzie:**

Wilgotne lub nawet mokre kopyta wchłaniają mniejszą ilość **HOOF STABILIZER**. Dlatego wystarczy nałożyć mniejszą ilość **HOOF STABILIZER** kilka razy w tygodniu. Jeśli to możliwe, rekomendujemy, by koń przebywał w suchym miejscu przez 1-2 godziny przed zabiegiem.

#### **Konie podkute:**

Nałożyć **KERALIT HOOF STABILIZER** na najniższą część ściany kopyta od podkowy aż do gwoździ. Nakładać od pazura w kierunku piętki, równoległe do koronki, obejmując około 1/3 ściany kopyta. Preparat należy nakładać również na podszwy u wrażliwych koni w celu uniknięcia stosowania wkładek. Oczyszczyć drutem stare otwory po gwoździach, aby umożliwić wniknięcie preparatu **KERALIT HOOF STABILIZER**.

#### **Konie bose:**

Nanieść **KERALIT HOOF STABILIZER** na ścianę wsporową i ścianę puszkki kopytowej. Nakładać od pazura w kierunku piętki, równoległe do koronki, obejmując około 1/3 ściany kopyta. Nakładać na podszwy u koni, które często poruszają się po twardym podłożu, jak również tych wrażliwych.

■ Stosować częściej (2-3 razy w tygodniu) tylko wtedy, gdy róg kopytowy (keratyna) wykazuje oznaki rozkładu.

■ Po użyciu przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Części kopyt koni podkutych i bosych, na które należy nakładać preparat przedstawiono na poniższych ilustracjach.

**KERALIT HOOF STABILIZER** nakładać zgodnie z instrukcją do wysokości ok. 1/3 ściany kopyta (ilustracja po lewej). W przypadku wrażliwych koni, stosować **KERALIT HOOF STABILIZER** od dołu do ściany wsporowej (prawa ilustracja), jak również na podszwę. Nakładać preparat wyłącznie na wskazane części kopyta, nie stosować na strzałkę, piętę i koronkę.



Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Produkt niebezpieczny w przypadku połknięcia, wdychania lub kontaktu ze skórą. Może powodować uczulenie. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami dokładnie spłukać wodą. W przypadku połknięcia produktu lub dostania się go dooczu należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i przedstawić etykietę produktu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczny dla zdrowia, zawiera aldehyd glutarowy. Nie karmić zwierząt produktem! Tylko do użytku zewnętrznego na róg kopytowy!

### **Instrukcje dot. stosowania!**

### **Tylko do użytku zewnętrznego na róg kopytowy/kopyto! Zawiera aldehyd glutarowy**

Może powodować podrażnienia skóry. Może powodować reakcje alergiczne skóry. Może powodować poważny uraz oczu. Może powodować reakcje alergiczne, objawy podobne do astmy lub dolegliwości układu oddechowego w przypadku wdychania. Może podrażniać drogi oddechowe. Unikać wdychania oparów/aerozoli. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. W PRZYPADKU WDYCHANIA: Jeśli oddychanie jest utrudnione, wynieść osobę na zewnątrz i umieścić w pozycji, w której łatwiej będzie jej oddychać. W przypadku podrażnienia skóry lub oczu, skonsultować się z lekarzem. W przypadku utrzymywania podrażnienia oczu: zwrócić się o pomoc lekarską. W przypadku połknięcia lub wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z lekarzem lub zadzwonić na INFOLINIĘ ALARMOWĄ ds. ZATRUĆ pod numerem +49(0)30 30686700



Niebezpieczeństwo

UFI: D600-606D-A00J-5AK0

Keralit Veterinär- und Pferdetechnik GmbH, Im Brenntenhau 1, D-71106  
Magstadt, +49 (0) 71 59 - 4 28 48 [www.keralit.de](http://www.keralit.de) / [info@keralit.de](mailto:info@keralit.de)

**Produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.**

**Pojemność 250 ml**