

KERALIT®

STRAHL-LIQUIDE

Pour le traitement et la prévention de la pourriture de la fourchette. Empêche les processus de décomposition de la corne au niveau de la fourchette.

KERALIT® Strahl-Liquide Instructions d'utilisation

Pour ouvrir, couper l'extrémité supérieure de l'embout. Le bouchon rouge sert à refermer le flacon. Avant le traitement, nettoyer soigneusement et à sec les lacunes médianes et latérales de la fourchette. Essuyer le fond des lacunes plusieurs fois avec un abaisse-langue en bois enveloppé dans un petit chiffon, retirer les morceaux de corne détachés. Commencer par appliquer **KERALIT® Strahl-Liquide** 1x par jour, puis tous les 2 à 3 jours après amélioration. Garder les pieds au sec, veiller à une bonne hygiène à l'écurie. En prévention, une application par semaine suffit. En cas de pourriture importante de la fourchette, une association **KERALIT® Strahl-Liquide et KERALIT® Undercover** s'avère judicieuse. La pâte **KERALIT® Undercover** convient particulièrement aux chevaux évoluant fréquemment sur un sol mouillé, étant donné qu'elle reste plusieurs jours dans les lacunes.



ATTENTION

Composants dangereux déterminants : Glutaral, isopropanol.

Provoque des irritations cutanées. Peut provoquer des réactions allergiques cutanées.

Provoque une sévère irritation oculaire. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer la vapeur/les aérosols. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. Se laver soigneusement les mains après utilisation. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

UFI : T300-POH0-1001-GYYX

Numéro d'appel d'urgence +49 30 30686700

(Numéro antipoison de l'hôpital universitaire de Berlin)