

**KERALIT®**

سائل ضدّ الحافر

للعلاج والوقاية من تعفن ضدّ الحافر.  
يمنع عمليات تحلل القرن في منطقة ضدّ الحافر.

### تعليمات استخدام سائل ضدّ الحافر KERALIT®

لفتح الأنبوب، اقطع طرف الفوهة عند نهايته العلوية. يُستخدم الغطاء الأحمر لإغلاق فوهة الأنبوب لاحقًا. نظّف أخاديد ضدّ الحافر جيّدًا وجفّفها قبل العلاج. يُفضّل استخدام قطعة قماش صغيرة ملفوفة حول أداة ضغط اللسان الخشبية لمسح أخاديد ضدّ الحافر بعمق عدة مرات، وإزالة الأجزاء السائبة من القرن. يُعطى سائل ضدّ الحافر KERALIT® في البداية مرة واحدة يوميًا، وبعد حدوث تحسن واضح يُستخدم فقط كل 2-3 أيام ويوزّع في أخاديد ضدّ الحافر. يجب إبقاء الحوافر جافة، والاهتمام بالنظافة الجيدة للإسطبيل. للوقاية، يكفي استخدام المنتج مرة واحدة أسبوعيًا. في حالات التعفن الشديد لضدّ الحافر، يُنصح باستخدام مزيج من سائل ضدّ الحافر KERALIT® ومعجون KERALIT® Undercover. وبالنسبة إلى الخيول التي تقف لفترات طويلة في بيئة رطبة، فإنّ معجون KERALIT® Undercover مثالي؛ إذ يظلّ ملتصقًا بأخاديد ضدّ الحافر لعدة أيام حتى في الظروف الرطبة.



تنبيه

المكونات الخطرة: جلوترال، إيزوبروبانول.  
يسبب تهيجًا للبشرة. يمكن أن يسبب تفاعلات حساسية في البشرة. يسبب تهيجًا شديدًا للعين. يمكن أن يسبب تهيجًا في الجهاز التنفسي. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. يجب تجنب استنشاق البخار/الهباء الجوي. يجب ارتداء قفاز حماية وواقي أذن. يجب غسل اليدين جيّدًا بعد الاستخدام. في حالة ملامسته للبشرة: يجب الغسل بكمية وفيرة من الماء والصابون. في حالة تهيج البشرة أو عند حدوث طفح جلدي، يجب استشارة الطبيب/طلب مساعدة الطبيب.

معرفّ UFI: T300-P0H0-1001-GYYX

رقم الطوارئ +49 30 30686700

(مركز مكافحة السموم في مستشفى شاريتيه الجامعي في برلين)