

KERALIT® STRÅLBEHANDLING

För behandling och förebyggande av strålröta. Förebygger nedbrytning av hornlagret vid strålen.

KERALIT® Strålbehandling bruksanvisning

Öppna genom att klippa av spetsen på munstycket. Spara det röda locket för förslutning efter användning. Rengör och torka strålfårorna noggrant innan behandling. Bäst är att torka ur strålfåran flera gånger med en liten tygtrasa svept kring en träspatel för att avlägsna löst horn. Applicera **KERALIT® Strålbehandling** i strålfårorna en gång per dag till att börja med, därefter med 2–3 dagars mellanrum när en tydlig förbättring uppnåtts. Håll hovarna torra och sörj för god stallhygien. I förebyggande syfte är behandling en gång i veckan tillräckligt. Vid svår strålröta rekommenderas en kombination av **KERALIT® Strålbehandling och KERALIT® Undercover**. För hästar som står längre perioder på fuktigt underlag är pastan **KERALIT® Undercover** optimal, eftersom den stannar kvar i strålfårorna i flera dagar även i fuktiga förhållanden.



FARA

Innehåller: glutaraldehyd, isopropanol.

Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas ångor/sprej. Använd skyddshandskar och ögonskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

UFI: T300-P0H0-1001-GYYX

Jourtelefon +49 30 30686700

(Giftinformation, Charité, Berlin)